

Información del paciente
MAVYRETTM (MAV-ih-
Reht)
(Glecaprevir y pibrentasvir)
tabletas

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre MAVYRET? MAVYRET puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:

Reactivación de hepatitis B virus. Antes de iniciar el tratamiento con MAVYRET, su médico le hará pruebas de sangre para detectar la infección por virus de la hepatitis B. Si alguna vez ha tenido infección por el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B podría volver a activarse durante o después del tratamiento para el virus de la hepatitis C con MAVYRET. virus de la hepatitis B, que se activa de nuevo (llamado reactivación) puede causar problemas hepáticos graves, como insuficiencia hepática y la muerte. Su profesional médico le controlará si usted está en riesgo de reactivación de hepatitis B virus durante el tratamiento y después de dejar de tomar MAVYRET.

Para obtener más información sobre los efectos secundarios, consulte la sección “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MAVYRET?”

¿Cuál es MAVYRET?

MAVYRET es un medicamento con receta utilizado para el tratamiento de adultos y niños de 12 años de edad y mayores o que pesan al menos 99 libras (45 kilogramos) con crónica (que dura mucho tiempo) virus de la hepatitis C (VHC) genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 infección sin cirrosis o con cirrosis compensada.

MAVYRET contiene los dos medicamentos: glecaprevir y pibrentasvir.

No se sabe si MAVYRET es segura y eficaz en niños menores de 12 años de edad.

No tome MAVYRET si:

- tener ciertos problemas de hígado
- También tomar cualquiera de los siguientes medicamentos:
 - atazanavir
 - rifampicina

Antes de tomar MAVYRET, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si:

- han tenido infección por el virus de la hepatitis B
- tener problemas en el hígado distintos de infección por el virus de la hepatitis C.
- tener infección por VIH-1
- han tenido un hígado o un trasplante de riñón
- si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si será MAVYRET dañar al feto.
- en período de lactancia o un plan para amamantar. No se sabe si MAVYRET pasa a la leche materna. Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé si se toma MAVYRET.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, Incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. MAVYRET y otros medicamentos pueden afectar el uno al otro. Esto puede hacer que usted tenga MAVYRET demasiado o no lo suficiente o de otros medicamentos en su cuerpo. Esto puede afectar la forma en MAVYRET o sus otros medicamentos, o puede causar efectos secundarios.

Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar su proveedor de atención médica y farmacéutico.

- Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que interactúan con MAVYRET.
- **No comience a tomar una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención médica.** Su profesional médico le puede decir si es seguro tomar MAVYRET con otros medicamentos.

¿Cómo debo tomar MAVYRET?

- Tome MAVYRET exactamente como su médico le dice que lo tome. No cambie su dosis a menos que su médico se lo indique.
- No deje de tomar MAVYRET sin antes consultar con su médico.
- Tomar 3 tabletas MAVYRET al mismo tiempo cada día.
- Tome MAVYRET con los alimentos.
- Es importante que no se pierda o se salta dosis de MAVYRET durante el tratamiento.
- Si se olvida una dosis de MAVYRET y es:
 - Menos de 18 horas desde el momento en que toma habitualmente MAVYRET, tome la dosis pasada con los alimentos tan pronto como sea posible. Luego tomar la siguiente dosis a la hora habitual.
 - Más de 18 horas desde el momento que toma habitualmente MAVYRET, no toman la dosis olvidada. Tome la siguiente dosis como de costumbre con los alimentos.
- Si se toman en exceso MAVYRET, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más cercano.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MAVYRET? MAVYRET puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:

- **Reactivación de hepatitis B virus.** Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre MAVYRET?”

Los efectos secundarios más comunes de MAVYRET incluyen dolor de cabeza y cansancio. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de MAVYRET.

Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1- 800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar MAVYRET?

- MAVYRET tienda en o por debajo de 86 ° F (30 ° C).
- Mantenga MAVYRET en su paquete de ampolla original hasta que esté listo para tomarla.

Mantenga MAVYRET y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de MAVYRET

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del paciente. No utilice MAVYRET para una enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé MAVYRET a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información sobre MAVYRET que está escrita para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de MAVYRET?

Ingredientes activos:glecaprevir y pibrentasvir

Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, copovidona (tipo K 28), croscarmelosa sódica, hipromelosa 2910, óxido de hierro rojo, lactosa monohidrato, polietilenglicol 3350, monocaprilato de propilenglicol (tipo II), estearil fumarato de sodio, dióxido de titanio, y vitamina E (tocoferol) polietileno succinato de glicol. Las tabletas no contienen gluten.

Fabricado por Abbvie Inc., North Chicago, IL 60064.

MAVYRET es una marca comercial de Abbvie Inc.

Para obtener más información, visite www.MAVYRET.com o llame al 1-800-633-9110.

Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos.

Revisado: April 2019

03-B917